

# 実習生の方へ

## ワクチン接種と感染症検査報告書提出について

三栄会（ツカザキ病院・三栄会広畑病院）では、患者ならびに実習生への感染伝播を防止するために、実習前にワクチン接種をお願いしています。つきましては、次項の「三栄会 実習前ワクチン接種（抗体価測定）判断フロー」に沿って、必要に応じてワクチン接種または抗体価検査を受けて下さい。その上で、別紙「三栄会 実習生ワクチン接種および感染症状況報告書」に必要事項記載の上、実習開始3週間前までに実習部門の責任者まで提出頂きますようお願いいたします。

### 対象

ツカザキ病院・三栄会広畑病院で1週間以上実習をされる方

### 報告書提出期日

実習開始3週間前まで

### 報告書

ツカザキ病院 HP→採用情報→実習生の受け入れについて→三栄会 実習生ワクチン接種及び感染症検査報告書

### 注意

<共通>

- ・書類に含まれる個人情報は感染症の流行防止以外の目的には使用いたしません。
- ・抗体価データ、接種証明書、母子手帳のコピー等の提出は不要です。

<流行性感染症（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）>

- ・ワクチン接種または抗体価測定が必須です。
- ・罹患歴の有無は判断指標としていないことについてご注意ください。
- ・ワクチン接種歴は母子手帳や接種記録証明などをもとに記載してください。
- ・いずれも生ワクチンであり、免疫機能に異常のある方、免疫抑制をきたす治療を受けている方、妊娠していることが明らかな方は接種出来ませんのでご注意ください。
- ・ワクチン接種ができない事由がある場合は、その旨をその所定の欄に記載して下さい。

<B型肝炎>

- ・必須ではありませんが、血液曝露の可能性がある職種・部門についてはワクチンを接種しておくことを推奨します。

<インフルエンザ>


- ・必須ではありませんが、シーズン中（10月～3月）はワクチンを接種しておくことを推奨します。

担当者

社会医療法人三栄会ツカザキ病院 感染制御室  
社会医療法人三栄会広畑病院 感染制御室

# 三栄会 実習前ワクチン接種（抗体価測定）判断フロー

## 流行性感染症（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）



判定表	判定①	判定②	判定③
麻疹	EIA法(IgG)16.0以上または PA法1:256以上または中和法1:8以上	EIA法(IgG)2.0～15.9または PA法1:16～1:128または中和法1:4	EIA法(IgG)2.0未満または PA法1:16未満または中和法1:4未満
風疹	EIA法(IgG)8.0以上またはHI法1:32以上	EIA法(IgG)2.0～7.9またはHI法1:8～1:16	EIA法(IgG)2.0未満またはHI法1:8未満
水痘	EIA法(IgG)4.0以上または IAHA法1:4以上または中和法1:4以上	EIA法(IgG)2.0～3.9または IAHA法1:2または中和法1:2	EIA法(IgG)2.0未満または IAHA法1:2未満または中和法1:2未満
流行性耳下腺炎	EIA法(IgG)4.0以上	EIA法(IgG)2.0～3.9	EIA法(IgG)2.0未満

## B型肝炎

### ワクチン接種の有無に関わらず実習可

安全確保のため、血液曝露する可能性の高い部門の場合は、接種しておくことを推奨する

#### 接種する場合

ワクチンを1クール（3回）接種する

1クール接種終了した4～8週後に  
HBs抗体価を測定する

HBs抗体価が10IU/ml以上であることを確認する

※10IU/mlを一度でも超えれば、以降は低下したとしても免疫獲得したことになります

## インフルエンザ

### ワクチン接種の有無に関わらず実習可

安全確保のため、シーズン中（10月～3月）は接種しておくことを推奨する